

Bentonit MED® Gebrauchsanweisung

BENTONIT MED® – ZUR NATÜRLICHEN ENTGIFTUNG DURCH BINDUNG VON QUECKSILBER, BLEI, CADMIUM, AMMONIUM UND HISTAMIN

Bentonit MED® ist als invasives Medizinprodukt der Klasse IIb ein natürlicher Bioregulator für die ganze Familie zur Vorbeugung, Therapie und Therapiebegleitung geeignet:

ZWECKBESTIMMUNG

Durch die Bindung (Adsorption) von:

- Ammonium
- Schwermetallen (Quecksilber, Blei, Cadmium)
- Histamin

sowie der wachstumshemmenden Wirkung bei:

- Bakterien (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus)
- Pilzen (Candida albicans, Aspergillus brasiliensis)

kann Bentonit MED® zur Entlastung der Leber durch Entgiftung des Darmtraktes angewendet werden. Sein natürlicher Gelfilm wirkt schützend auf die Schleimhaut des Verdauungstraktes.

ANWENDUNGSGEBIETE

Bentonit MED® kann zur Vorbeugung und Linderung von Symptomen z. B. bei folgenden Erkrankungen angewendet werden:

- **Allergien**
z. B. Heuschnupfen, Erbrechen, Durchfall, Bindehautentzündung, Neurodermitis, Kontaktekzem, Urtikaria, Asthma
- **Nahrungsmittelunverträglichkeiten**
z. B. Leaky Gut Syndrom
- **Histaminintoleranz**
z. B. Verdauungsbeschwerden, Kopfschmerzen, Erschöpfungszustände, Hautrötungen, Juckreiz, Ekzeme, Atembeschwerden, Ödeme
- **Erkrankungen der Leber**
z. B. Burnout, Depressionen, Schlafstörungen, Hepatitis, Fettleber, Leberzirrhose
- **Erkrankungen der oberen Verdauungsorgane**
z. B. Entzündungen im Mund- und Rachenbereich, chronische Magen- und Darmbeschwerden, Sodbrennen
- **Erkrankungen durch Schwermetallbelastungen**
z. B. Neurodegenerative Erkrankungen, unerfüllter Kinderwunsch, Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Depression
- **zur Entlastung nach Antibiotika-, Chemotherapien**

DOSIERUNG UND DAUER

Falls von Ihrem Therapeuten nicht anders verordnet, sollte eine Kur mindestens 40 Tage oder auch über einen längeren

Zeitraum betragen. Beginnen Sie bitte mit 1 mal täglicher Anwendung. Bei Bedarf kann die Anwendung langsam auf 2 mal täglich, maximal 3 mal täglich gesteigert werden. Bei Kindern konsultieren Sie bitte Ihren Therapeuten, bevor Sie Bentonit MED® in adäquater Dosierung anwenden.

Bentonit MED® Pulver

Falls von Ihrem Therapeuten nicht anders verordnet, können Sie je nach Bedarf 1 bis 3 mal täglich 1 leicht gehäuften Teelöffel (3g) Bentonit MED® Pulver jeweils 30 Minuten vor oder nach den Mahlzeiten in 200 ml Wasser verquirlen und unmittelbar trinken, maximal 10g täglich.

Bentonit MED® Kapseln

Falls von Ihrem Therapeuten nicht anders verordnet, können Sie je nach Bedarf 1 bis 3 mal täglich 1 – 2 Kapseln Bentonit MED®, jeweils 30 Minuten vor oder nach den Mahlzeiten mit 200 ml Wasser einnehmen, maximal 6 Kapsel täglich.

REGELMÄSSIGKEIT, RHYTHMUS UND ANWENDUNGSZEITEN

Die Regelmäßigkeit der Anwendung beeinflusst die Wirksamkeit, Unterbrechungen können diese vermindern. Finden Sie nachstehend einfach Ihre für Sie passenden Zeitfenster. Nach Karl Hecht, Dr. med. Dr. med. habil. Prof. für Neurophysiologie em. Prof. für experimentelle und klinische pathologische Physiologie der Charité / Humboldt-Universität zu Berlin, empfehlen sich chronobiologisch bei der inneren Anwendung am Menschen folgende Tageszeiten:

6 – 8 Uhr
13 – 15 Uhr
18 – 20 Uhr

für die Nachtversorgung: 22 Uhr

WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN MITTELN

Nach Einnahme von Medikamenten soll ein Zeitabstand von mindestens 2 Stunden eingehalten werden. Alkoholische, koffeinhaltige und säurehaltige Getränke wie Grapefruit-, Orangen-, Zitronen- und Ananassaft meiden.

NEBENWIRKUNGEN

In seltenen Fällen kann bei zu geringer Flüssigkeitszufuhr Verstopfung auftreten. Dieser Effekt ist dosisabhängig und kann durch ausreichende Flüssigkeitszufuhr und Dosisreduktion vermieden werden. Bei auftretender Verstopfung ist die Flüssigkeitszufuhr zu erhöhen, die Dosierung zu reduzieren und ggf. der Therapeut zu konsultieren.



WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Bentonit MED® ist kein Ersatz für ein Allergikum.

Um die Entgiftungs- und Regulierungsprozesse zu unterstützen, ist während der Einnahme von Bentonit MED® für reichliche Flüssigkeitszufuhr zu sorgen, sowohl bei der Einnahme (0,2 Liter Wasser) als auch in Bezug auf die Tagesration (2–3 Liter/Tag).

Bei einem medizinischen Problem, während der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Kindern konsultieren Sie bitte Ihren Therapeuten, bevor Sie Bentonit MED® anwenden.

Das Medizinprodukt darf nicht inhaliert (eingeatmet) und nicht am Auge angewendet werden. Spülen Sie bei Augenkontakt die Augen ausreichend.

Beenden Sie die Anwendung, wenn Sie einen unüblichen Effekt bemerken.

LAGERUNG UND VERWENDBARKEIT

Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern unter 6 Jahren auf.

Schließen Sie die Verpackungseinheit immer nach der Verwendung.

Lagern Sie das Produkt trocken und bei Zimmertemperatur. Das Verfallsdatum ist auf dem Verpackungsboden aufgedruckt. Verwenden Sie das Produkt nicht nach überschreiten des Verfallsdatums.

INHALTSSTOFFE

Montmorillonit-Bentonit

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Inhalt und Verpackung kann mit dem Hausmüll entsorgt werden, Violettgläser im Grünglascontainer.

MEDIZINPRODUKTEHERSTELLER

Zeolith-Bentonit-Versand.de, Inhaberin Marika Müller
Eichendorffstr. 35, 09131 Chemnitz, Deutschland
Telefon +49 (0) 371 8 20 59 75, Fax +49 (0) 371 30 27 47
E-Mail: info@zeolith-bentonit-versand.de
Internet: www.zeolith-bentonit-versand.de



Stand der Information: August 2014